

SAMMLUNG VON 24-STUNDEN-URIN

ERSTER URIN Morgens Blase in der Toilette entleeren und Uhrzeit notieren.

SAMMELN

Während der nächsten 24 Stunden den Urin in der Sammelflasche sammeln. Falls eine Zugabe von Salzsäure (HCL 20%) gemäss Auftragsformular nötig ist, bitte diese nach dem ersten Wasserlösen in die Sammelflasche geben.



ACHTUNG Salzsäure ist ätzend. Haut und Augenkontakt vermeiden. Nach jedem Wasserlösen die Flasche gut verschliessen, den Inhalt gut mischen und kühl lagern.

LETZTER URIN Lösen Sie zur vermerkten Uhrzeit vom Vortag ein letztes Mal den Urin in die Sammelflasche.

SAMMELZEIT

Beginn der Urinsammlung

Datum _____ Uhrzeit _____

Ende der Urinsammlung

Datum _____ Uhrzeit _____

RÜCKGABE Sammelflasche nach der Sammlung zur vereinbarten Zeit in die Praxis bringen.

INFO FÜR DIE PRAXIS

Urinmenge auf der seitlichen Skala ablesen und auf dem Auftragsformular vermerken. Für die Einsendung ins Labor nur die 100 ml-Flasche (Flasche mit schwarzem Deckel) benutzen.

INFO FÜR DEN PATIENTEN

Diätvorschrift für die Analysen 5-Hydroxy-Indolessigsäure, (Homo-) Vanillinmandelsäure, Katecholamine, Metanephrin und Normetanephrin im Urin: 48 Stunden vor Sammelbeginn und während der Sammlung sind zu meiden:
vanillinhaltige Nahrungsmittel, Bananen, Ananas, Nüsse, Kaffee, Schwarztee, Schokolade, Tomaten, Pflaumen, Kiwis, Nikotin.
Sport und starke körperliche Arbeit vermeiden.